



Hoja Informativa de la Faringitis Estreptocócica

La faringitis estreptocócica es un tipo de dolor de garganta que puede ocurrir cuando una persona está infectada por bacterias estreptococos del grupo A (GAS). Se caracteriza por una garganta roja, a menudo con manchas blancas en las amígdalas; Glándulas linfáticas inflamadas en el cuello, fiebre y dolor de cabeza también puede ocurrir. Náuseas, vómitos y dolor abdominal son más comunes en los niños.

Aunque cualquier persona puede contraer faringitis estreptocócica, no es habitual en los niños menores de 3 años de edad. La faringitis estreptocócica es más frecuente en niños de 6-12 años. Después de 12 años de edad, se ven menos casos.

Desafortunadamente, infecciones de la garganta por estreptococos pueden ocurrir en una persona más de una vez, porque hay muchos tipos diferentes de bacterias estreptocócicas que causan esta infección.

¿Cuándo una persona debe buscar atención médica para un "dolor" de garganta?

Las personas que tienen dolor de garganta durante más de una semana, tienen una fiebre de más de 100.4 °F, dificultad para tragar o respirar, pus en la parte posterior de la garganta, sangre en la saliva o flema, sarpullido, o ronquera que dura más de 2 semanas se debe buscar atención médica.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





Hoja Informativa de la Faringitis Estreptocócica

Cualquier persona que desarrolle síntomas de faringitis estreptocócica mientras vive en la misma casa con personas que se sabe que tienen faringitis estreptocócica también deben consultar a un médico. Los síntomas de la faringitis estreptocócica usualmente aparecen 2-4 días después de la exposición a las bacterias".

¿Cuál es la diferencia entre un "dolor" de garganta y faringitis estreptocócica?

Los dolores de garganta pueden ser causados por muchos virus y bacterias diferentes, por lo que es difícil, incluso para los médicos que conocen la causa sin pruebas de laboratorio. Una prueba de frotis de garganta de laboratorio sencilla y realizada por un profesional sanitario, puede distinguir faringitis estreptocócica de un "dolor" de garganta. Este es un paso importante. La mayoría de las gargantas doloridas " no responden a los antibióticos y desaparecen en pocos días sin tratamiento. La faringitis estreptocócica responde a los antibióticos, y si no se diagnostica ni se trata puede conducir a complicaciones poco frecuentes pero graves, como la fiebre reumática.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de la Faringitis Estreptocócica

¿Cuál es el tratamiento para la faringitis estreptocócica?

Debido a las bacterias que causan faringitis estreptocócica, ésta se trata fácilmente con antibióticos. Es muy importante para todas las personas con diagnóstico de faringitis estreptocócica a tomar todo el antibiótico prescrito. Esto matará la bacteria estreptococo y evita el pequeño riesgo de complicaciones observadas con infecciones de la garganta por estreptococos.

¿Cómo se transmite la bacteria GAS?

Bacterias estreptococos se propagan cuando una persona infectada tose o estornuda directamente en otra persona. El contacto casual, como sentado al lado de las personas infectadas, rara vez conduce a la infección.

¿Por cuánto tiempo una persona puede contagiar la bacteria estreptococo GAS?

Una persona sin tratamiento puede propagar las bacterias durante el tiempo de 2-3 semanas. Con la terapia de antibiótico adecuado, sin embargo, la persona tratada es por lo general sólo contagiosa durante 24 a 48 horas.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de la Faringitis Estreptocócica

Por esta razón, las personas con diagnóstico de "faringitis estreptocócica" deben descansar tranquilamente en casa, no asistir a centros de trabajo, la escuela o guardería, hasta que el antibiótico se ha tomado por lo menos 24 horas.

Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma (405) 425-4437

revisado 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

