



## Hoja de información sobre Hepatitis B

### ¿Qué es hepatitis B?

La Hepatitis B es un virus que entra en el torrente sanguíneo e infecta el hígado. Las Infecciones a largo tiempo (“portador”) son comunes y pueden resultar en enfermedad crónica del hígado o cáncer.

### ¿A quién le da hepatitis B?

Cualquiera puede tener hepatitis B. Sin embargo, ciertas personas tienen un riesgo mayor de llegar a infectarse. Estas personas incluyen los que usan drogas inyectadas, bebés de madres infectadas, compañeros sexuales de personas infectadas, incluyendo hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; trabajadores médicos y dentales; y personas que viven en una casa donde hay un “portador”.

### ¿Cómo se disemina el virus?

La hepatitis B es más frecuentemente diseminada de persona a persona a través del contacto con semen infectado, secreciones vaginales o sangre. Tener relaciones sexuales con una persona infectada y compartir agujas para el uso de drogas son dos formas comunes en que las personas pueden llegar a infectarse. Los bebés nacidos de madres infectadas y personas que viven en la casa con un “portador” de hepatitis B también tienen riesgo.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja de información sobre Hepatitis B

### ¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden ser leves o pueden ser muy severos. Los síntomas incluyen estar muy cansado, náusea, vómitos, fiebre, dolor de estómago, orina color de té, y piel y ojos amarillentos (ictericia). La mayoría de las personas infectadas con hepatitis B no desarrollan todos estos síntomas y puede ser que nunca sepan que fueron infectados.

### ¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?

La pérdida de apetito y dolor de estómago comúnmente aparecen dentro de dos a tres meses, pero puede ocurrir de seis semanas a seis meses después de la infección.

### ¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada diseminar el virus?

Una persona puede diseminar el virus siempre y cuando permanezca en su sangre. La mayoría de adultos eliminan el virus dentro de cuatro a seis meses, sin embargo, más o menos uno de cada diez adultos serán “portadores” de por vida, significando que ellos probablemente nunca podrán deshacerse del virus. Tanto como nueve de cada diez bebés infectados llegarán a ser portadores.

### ¿Cómo se diagnostica la hepatitis B?

Un examen de sangre es usado para detectar la infección con el virus de hepatitis B.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja de información sobre Hepatitis B

### **¿Puede una persona tener hepatitis B otra vez?**

Si se desarrollan los anticuerpos, una infección con el virus de hepatitis B protege a una persona para no tenerla otra vez. Los portadores se mantendrán infectados por el resto de su vida. Sin embargo, hay diferentes clases de hepatitis; la infección con hepatitis B no detendrá a una persona para tener otros tipos de hepatitis.

### **¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis B?**

No hay un tratamiento específico para que la infección desaparezca. Las personas que están enfermas con hepatitis B deberían de ver a un doctor que les aconseje como controlar los síntomas. El “Interferon” es una droga especial que se da algunas veces a los portadores de hepatitis B que tienen enfermedad seria del hígado.

*Para mayor información, comuníquese al Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al*

(405) 425-4437

revisado 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

