



## Hoja informativa Rotavirus

### ¿Qué es el rotavirus?

El rotavirus es una infección viral que infecta el intestino. Es la causa más común de diarrea en los niños y por lo general se produce entre los meses de noviembre y mayo.

### ¿Quién contrae el rotavirus?

El rotavirus es más frecuente en los niños de 6 meses a 24 meses, aunque cualquier persona puede infectarse. La mayoría de los niños se han infectado con rotavirus antes de los 3 años de edad.

### ¿Cómo se transmite el virus?

La ruta fecal-oral es la forma más común en que el Rotavirus se propaga. También se puede transmitir por la inhalación de gotitas del aparato respiratorio infectadas o al tocar objetos contaminados. Hay evidencia de que el rotavirus puede estar presente en el agua contaminada.

### ¿Cuáles son los síntomas?

Las personas infectadas con rotavirus pueden tener fiebre, malestar estomacal, cólicos abdominales, vómitos y diarrea acuosa, no sanguinolenta, que puede durar de 3 a 8 días. También puede haber una tos o secreción nasal. Algunas personas infectadas pueden no tener síntomas.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





## Hoja informativa Rotavirus

### **¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?**

Los síntomas aparecen generalmente 2 días después de la infección y pueden durar hasta 8 días, con un promedio de 4-6 días.

### **¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar el virus?**

El período de contagio es por lo general menos de una semana. Sin embargo, las personas inmunocomprometidas pueden excretar el virus durante meses.

### **¿Puede una persona volverse a infectarse con el virus?**

Sí, la reinfección puede ocurrir si la persona recibe una dosis alta de virus o si son inmunodeprimidos. Reinfecciones son generalmente más leves que las primeras infecciones.

### **¿Cuál es el tratamiento?**

El tratamiento consiste en el manejo de los síntomas, asegurándose de ingesta de líquidos y nutrición adecuadas.

[OCCHD.ORG](http://OCCHD.ORG) |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





## Hoja informativa Rotavirus

### ¿Qué se puede hacer para prevenir la propagación del rotavirus?

Todos deben lavarse cuidadosamente las manos con jabón y agua corriente después de ir al baño o manipular pañales sucios, y antes de comer o preparar alimentos. El virus sobrevive durante largos periodos en superficies duras, en el agua contaminada y en las manos. Es relativamente resistente a los desinfectantes de uso común, pero se inactiva por el cloro (lejía).

**Excluir cualquier niño con diarrea de las guarderías hasta que los síntomas hayan desaparecido.**

La vacuna contra el rotavirus es muy eficaz en la prevención de la gastroenteritis por rotavirus. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos (ACIP) recomienda la vacunación sistemática de los lactantes con cualquiera de las 2 vacunas disponibles. RotaTeq® (RV5), autorizado en 2006, se da en 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses; Rotarix® (RV1), autorizado en 2008, se da en 2 dosis a los 2 y 4 meses. Estas vacunas se diferencian en la forma en que se hacen y cuando se administran, pero ambas se dan por vía oral y ambas proporcionan protección contra la enfermedad.

*Para mayor información contacte el Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma*

(405) 425 – 4437

revisado 04/2013

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

