



Hoja de información sobre Ciprofloxacina

¿Qué es ciprofloxacina?

La Ciprofloxacina, comúnmente conocida como cipro, pertenece a la clase de drogas llamadas antibióticos quinolonas. Ha sido aprobado por la Administración de Comidas y Drogas por sus siglas en inglés (FDA) para tratar y proteger a las personas que han sido expuestas a las esporas del antrax. La ciprofloxacina es usualmente proporcionada en tabletas orales de 500-mg o como suspensión para niños.

¿Cómo tomar cipro?

Adultos: Tome 1 tableta cada 12 horas como se le indica. **Cada persona debe tomar todas las tabletas de su frasco.**

Niños: La dosis de un niño depende de su peso corporal. Dele la medicina a su niño como se le indica en el documento adicional de dosificación.

Es mejor tomar tomar cipro 2 horas antes o después de las comidas con por lo menos un vaso lleno de agua. Sin embargo, si ocurre molestia estomacal, Cipro puede tomarse con comida. Evite productos lácteos como leche y yogurt por lo menos 3 horas antes y después de tomar la medicina. Si toma vitaminas o antiácidos como Tums o Maalox, tómelos 6 horas antes o 2 horas después de tomar cipro.

Dosis de Cipro en un ataque de Antrax:

Un curso inicial de 10 días será provisto a todos los individuos que pudieron haber sido expuestos al ántrax. Un curso adicional de cipro por 50 días será provisto a individuos que han sido identificados como directamente expuestos al ataque de antrax.

¿Qué hacer en caso de olvidar una dosis?

Si olvida una dosis, principie tomando una tableta cada 12 horas. No tome 2 tabletas para reponer la dosis olvidada. Termine todas sus tabletas aunque ya se sienta bien, a menos que su doctor le diga que pare. Si usted deja de tomar la medicina muy pronto puede llegar a enfermarse.

Efectos secundarios de cipro

Los efectos secundarios mas comunes de Cipro incluyen molestias estomacales, vómitos, diarrea, fatiga, mareos o dolor de cabeza. Si usted tiene problema con cualquiera de estos síntomas, dígame a su doctor. Efectos secundarios menos comunes incluyen dolor, hormiguéo en brazos y/o piernas cambios en su visión, inquietud, zumbido de oídos, tendinitis, ruptura de tendón o cambios mentales. Si alguno de estos síntomas ocurre llame a su doctor inmediatamente. **Las reacciones alérgicas severas son muy raras.** Los signos de una reacción alérgica incluye ronchas, comezón, hinchazón de la lengua, manos o pies Signs of an allergic reaction include, rash, itching, swelling of the tongue, hands or feet, fever, or trouble breathing. If any of these symptoms occur, call your doctor right away.