



## Hoja de información sobre Levofloxacina

### ¿Qué es levofloxacina?

Levofloxacina pertenece a una clase de antibióticos llamados quinolonas. Ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar y proteger a las personas que han estado expuestas a las esporas de ántrax. La Levofloxacina se presenta generalmente en un comprimido oral de 750 mg o una suspensión oral para niños.

### Cómo tomar levofloxacina?

**Adultos:** Tomar 1 comprimido cada 24 horas, según las indicaciones. Es importante tomar este medicamento a la misma hora todos los días.

**Niños:** La dosis para un niño depende de su peso corporal. Dele el medicamento a su hijo según se indica en la documentación adicional de la dosificación.

Es mejor tomar la levofloxacina 2 horas antes o después de una comida con al menos un vaso grande de agua. Sin embargo, si se produce un malestar estomacal, la levofloxacina puede ser tomada con alimentos. Evite los productos lácteos como la leche y el yogur durante al menos 2 horas antes y después de tomar el medicamento. Si usted toma vitaminas o antiácidos como Tums o Maalox, tómelos 2 horas antes o 2 horas después de tomar levofloxacina.



## Hoja de información sobre Levofloxacin

### **Dosificación de Levofloxacin en un ataque de Ántrax:**

Un tratamiento inicial de 10 días será proporcionado a todas las personas que puedan haber estado expuestas al ántrax. Un tratamiento adicional de 50 días de levofloxacin se dará a las personas que han sido identificados como expuestos directamente al ataque de ántrax.

### **¿Qué hacer si se le olvida de tomar una dosis?**

Si se le olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible y continúe tomándolo cada 24 horas. Si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario regular. No tome 2 píldoras para compensar la dosis olvidada. Tómese todas las pastillas, incluso si se siente bien, a menos que su médico le indique que lo suspenda. Si deja de tomar el medicamento antes de tiempo, puede enfermarse.

### **Los efectos secundarios de levofloxacin?**

Los efectos secundarios comunes de levofloxacin son malestar estomacal, vómitos, diarrea, fatiga, mareos o dolor de cabeza. Si usted tiene problemas con cualquiera de estos síntomas, informe a su médico. Los efectos secundarios menos comunes incluyen coloración amarillenta de la piel y los ojos, temblores, inquietud, sensación de hormigueo en los brazos y las piernas, insomnio, convulsiones, inflamación de venas o del colon, cristales en la orina, tendinitis, ruptura de tendones, o cambios mentales. Si presenta cualquiera de estos síntomas, llame a su médico de inmediato.

**WELLNESS NOW**



**Las reacciones alérgicas graves son muy raras.** Los signos de una reacción alérgica incluyen, erupción cutánea, picor, hinchazón de la lengua, las manos o los pies, fiebre o dificultad para respirar. Si presenta cualquiera de estos síntomas, llame a su médico de inmediato.

**Nota especial para los niños:** Este medicamento puede causar problemas en las articulaciones en los lactantes y los niños menores de 18 años de edad. Si su hijo tiene algún dolor en las articulaciones, mientras que él / ella está tomando la levofloxacin, informe a su médico.

**Precauciones:**

- Asegúrese de decirle al médico si usted es alérgico a cualquier medicamento
- Es muy importante decirle a su médico acerca de todos los medicamentos que está tomando actualmente, incluyendo pastillas compradas en la tienda, como las vitaminas y los antiácidos.
- Dígale al médico si usted alguna vez ha tenido convulsiones, accidente cerebrovascular o problemas en los riñones, las articulaciones o tendones, el hígado o la visión. Reporte cualquier historia de sangrado o moretones inusuales.
- Si este medicamento le produce mareo, tenga cuidado de conducir o hacer tareas que requieran que esté alerta. Evite el alcohol, en este caso, ya que el mareo se empeorara con el alcohol.

**WELLNESS NOW**

- La levofloxacinina puede hacer que la piel se vuelva tan sensitiva al sol que aumenta la probabilidad de padecer quemaduras solares graves. Evite el sol tanto como sea posible. Al aire libre, use camisa de manga larga y un sombrero, y siempre aplíquese protector solar (SPF 30).
- En las mujeres, la levofloxacinina puede causar picazón y secreción vaginal conocida como infección por levaduras. Dígale a su médico si esto ocurre.
- Si está embarazada o dando el pecho a su hijo, dígaselo a su médico, ya que la seguridad de levofloxacinina durante el embarazo es desconocida. Si está embarazada o acaba de embarazarse, informe a su médico.
- La levofloxacinina puede aumentar los efectos de la cafeína y la teofilina (un medicamento).
- La levofloxacinina puede alterar los niveles de glucosa sanguínea en personas que toman medicamentos antidiabéticos o insulina, dando una cifra ya sea más baja o más alta de lo normal. Vigile de cerca los niveles de glucosa en la sangre.

*Para más información, comuníquese con el  
Departamento de Salud de la Ciudad y  
Condado de Oklahoma (405) 425-4437.*

revised 02/2014

