



## Hoja Informativa de Moxifloxacina (Avelox)

### **Qué es la Moxifloxacina?**

La Moxifloxacina (Avelox) pertenece a la clase de antibióticos quinolona. Este tipo de drogas ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para tratar y proteger a la gente que ha sido expuesta a esporas de ántrax. Es típicamente administrada en tabletas de 400 mg por vía oral. No se sabe si la moxifloxacina es segura para personas menores de 18 años. Consulte a su doctor para el uso moxifloxacina en niños.

### **Cómo debo tomar moxifloxacina?**

**Adultos:** Tomar una tableta por día como se ha recomendado. Tratar de tomar la tableta a la misma hora cada día. Tomar suficiente líquido con el medicamento.

**Niños:** Consulte a su médico.

### **Las dosis de moxifloxacina durante un ataque bioterrorista con ántrax:**

Inicialmente se provee un tratamiento de 10 días a todos los individuos que pudieron haber sido expuestos a ántrax. Un tratamiento adicional de 50 días será administrado a los individuos identificados, directamente expuestos a ántrax en un ataque.

### **Las dosis de moxifloxacina durante un ataque bioterrorista involucrando plaga:**

El medicamento debe ser administrado al menos por 10 días para aquellos que fueron expuestos a la plaga. Más adelante se administrarán otras dosis. Consulte a su médico o proveedor de salud.



## Hoja Informativa de Moxifloxacina (Avelox)

### **Que hago si pierdo una dosis?**

Comience tomando la tableta una vez al día. No exceda de 2 tabletas al día, aún si perdió una dosis. Termine todas sus pastillas se sienta enfermo o no, a menos que el doctor le recomiende parar el tratamiento. Si suspende el tratamiento puede resultar en la enfermedad, con la posibilidad de resistencia al medicamento.

### **Cuáles son los efectos secundarios de la moxifloxacina?**

Los mas leves efectos secundarios incluyen náusea, diarrea moderada, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, nerviosismo, ansiedad, agitación y comezón moderada. **Reacciones alérgicas son muy raras.** Si desarrolla erupción en la piel, hinchazón de la lengua, labios, o cara, u otros síntomas serios, consulte a su doctor inmediatamente. Estos son signos de reacción alérgica.

**Noticia Especial:** Este medicamento puede causar problemas en los tendones, y puede empeorar síntomas de miastenia grave, una condición que causa debilidad muscular. Diga a su doctor si experimenta dolor de tendones, inflamación o desgarres. También diga a su doctor si tiene aumento de debilidad muscular o problemas para respirar mientras esta en tratamiento con moxifloxacina.



## Hoja Informativa de Moxifloxacin (Avelox)

### Precauciones

- Diga a su doctor todos los medicamentos que esté tomando actualmente, incluyendo suplementos y medicinas sin receta. Medicamentos comunes pueden reaccionar con la moxifloxacin.
- Informe a su doctor si tiene historia de problemas de tendones, debilidad muscular, o alguna otra condición médica crónica.
- No maneje y no opere maquinaria hasta que sepa cómo su cuerpo reacciona al medicamento.
- Diga a su doctor si esta embarazada o piensa embarazarse.
- Diga a su doctor si esta amamantando o planea hacerlo.

*Para mayor información, contacte al  
Departamento de Salud de la Ciudad  
de Oklahoma  
(405) 425-4437  
revised 08/2015*

**WELLNESS NOW**