



Hoja de Información sobre la Ciprofloxacina

¿Qué es ciprofloxacina?

La Ciprofloxacina, comunmente conocida como cipro, pertenece a la clase de drogas llamadas antibióticos quinolonas. Ha sido aprobado por la Administración de Comida y Drogas por sus siglas en Inglés (FDA) para tratar y proteger a las personas que han sido expuestas a la bacteria de la plaga. La Ciprofloxacina es usualmente proporcionada en tabletas orales de 500-mg o en suspensión oral para niños.

¿Cómo se toma la ciprofloxacina?

Adultos: Tome 1 tableta cada 12 horas como se le indica. **Cada persona debería tomar todas las pastillas de su frasco.**

Niños: La dosis de un niño depende de su peso corporal. Dele la medicina a su niño como se le indica en el documento adicional de dosificación.

Es mejor tomar cipro 2 horas antes o después de las comidas por lo menos con un vaso grande de agua. Sin embargo, si ocurre molestia estomacal, cipro puede tomarse con comida. Evite productos lácteos como leche y yogurt por lo menos 3 horas antes y después de haber tomado la medicina. Si toma vitaminas o antiácidos como Tums o Maalox, tómelos 6 horas antes o después de haber tomado Cipro.

Dosis de cipro en un ataque de Plaga:

Un tratamiento de 7 días será provisto a todos los individuos que pudieran haber sido expuestos a la plaga.

¿Qué hacer en caso de olvidar una dosis?

Si usted pierde una dosis, principie tomando una tableta cada 12 horas. No tome 2 tabletas para reponer la dosis perdida. Termine todas sus tabletas, aunque ya se sienta bien, a menos que su doctor

le diga que pare. Si usted deja de tomar la medicina muy pronto, puede llegar a enfermarse.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Cipro?

Los efectos secundarios más comunes de cipro incluyen molestias estomacales, vómitos, diarrea, fatiga, mareos o dolor de cabeza. Si usted tiene problemas con cualquiera de estos síntomas, dígame a su doctor. Efectos secundarios menos comunes incluyen dolor u hormigueo en brazos y/o piernas, cambios en su visión, inquietud, zumbido de oídos, tendinitis, ruptura de tendón o cambios mentales. Si alguno de estos síntomas ocurre llame a su doctor inmediatamente.

Reacciones alérgicas severas son muy raras. Signos de una reacción alérgica incluyen, ronchas, comezón, edema o hinchazón de la lengua, manos o pies, fiebre o dificultad para respirar. Si cualquiera de estos síntomas ocurre, llame a su doctor inmediatamente.

Nota especial para niños: Esta medicina puede causar problemas de las articulaciones en infantes y niños menores de 18 años de edad. Si su niño tiene algún dolor articular mientras el /ella están tomando cipro, dígaselo a su doctor.

Precauciones:

-Asegúrese de decirle a su doctor si usted es alérgico a alguna medicina -Es muy importante decirle a su doctor acerca de TODOS los medicamentos que actualmente está tomando aún pastillas que fueron compradas en la tienda como vitaminas y antiácidos. –Dígale a su doctor si alguna vez ha tenido una convulsión, derrame cerebral o accidente cerebro vascular, o problemas con sus riñones, articulaciones o tendones, hígado o visión. Reporte cualquier historia de sangrado no usual o moretes. -Si esta droga lo mareo, use precaución cuando maneje o haga tareas que requieren manejar o estar alerta. Evite alcohol en este caso, pues hará que marearse sea peor. -Cipro puede hacer la piel más sensible al sol lo que aumenta el riesgo de tener severas quemaduras de sol. Evite el sol lo más que pueda. Cuando esté afuera, use camisa de manga larga y sombrero y siempre aplíquese protector solar (30 SPF). – En mujeres, cipro puede causar comezón y secreción vaginal, conocida como infección por

hongos. Dígale a su doctor si esto ocurre. Si está embarazada o dando pecho dígaselo a su doctor, ya que la seguridad de Cipro durante el embarazo se desconoce. Si está embarazada o va a embarazarse, dígaselo a su doctor, Cipro puede aumentar los efectos de la cafeína y de la teofilina (una medicina).

Para más información, comuníquese con el Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al (405) 425-4437

WELLNESS NOW