

Esta hoja explica como administrar las dosis de emergencia de  
**Tamiflu (o seltamivir) Suspensión**

Para la prevención de la Influenza en cualquier persona menor de 88 años.

*Una vez que usted ha sido notificado por sus autoridades federales, estatales o locales que ha sido expuesto a la Influenza, puede ser necesario administrar dosis de emergencia de Tamiflu (oseltamivir) a los infantes y a los niños.*

### **Direcciones:**

Un dispensador oral con graduaciones de 30 mg, 45 mg, and 60 mg será provisto con la suspensión oral; la dosis de 75 mg puede ser medida usando una combinación de 30 mg y 45 mg. Se recomienda que los pacientes usen el dispensador. Si acaso el dispensador provisto se pierde o se daña, otra jeringa dosificadora o algún otro medidor podría ser usado para dar los siguientes volúmenes: 2.5 ml (1/2 cucharadita) para niños ≤33 lbs, 3.8 ml (3/4 de cucharadita) para niños >33 a 51 lbs, 5.0 ml (1 cucharadita) para >51 to 88 lbs, y 6.2 ml (1 ¼ cucharadita) para >88 lbs.

### **Qué cantidad de suspensión de Tamiflu debe de darle a su niño**

El número de cucharaditas de Tamiflu que debe de darle a su niño depende de su peso. **Si el peso del niño es desconocido, pese al niño antes de darle la primera dosis.** La gráfica le indica que cantidad debe de darle a su niño por dosis. Debe de darle una dosis cada día (una vez en la mañana).

<i>si el niño pesa</i>	<b>dele al niño</b>
≤ 33 libras (lbs.)	<b>Media (1/2) cucharadita (tsp) o 30 mg de la solución de Tamiflu</b>
>33 – 51 (lbs.)	<b>Tres cuartos (3/4) de cucharadita(tsp) o 45 mg de la solución de Tamiflu</b>
>51 – 88 (lbs.)	<b>Una cucharadita (tsp) o 60 mg de la solución de Tamiflu</b>
>88 (lbs.)	<b>Una cucharadita y un cuarto (1 ¼) o 75 mg de la solución de Tamiflu</b>

La dosis recomendada de Tamiflu como profiláctico para la influenza, en adultos y adolescentes de 13 años o mayores, es de 75 mg una vez al día por 10 días. El tratamiento debe de principiarse dentro de 2 días después de haber sido expuesto.

### **Como debe de almacenarse la solución de Tamiflu ya preparada**

- La solución de Tamiflu se mantiene bien por 10 días si es refrigerado.