



Thông tin về bệnh Tularemia

Bệnh tularemia là gì?

Tularemia là một bệnh ảnh hưởng cả động vật và con người. Được gây ra bởi vi khuẩn mà vi khuẩn đó có thể sống từ 3 đến 4 tháng trong bùn, nước hoặc xác động vật. Con người có thể nhiễm bệnh tularemia qua việc cầm hoặc chạm vào những động vật bị nhiễm bệnh hoặc bị cắn bởi những con ruồi, muỗi hoặc con ve nhiễm bệnh. Con người có thể nhiễm bệnh vào mùa hè hoặc mùa đông. Trong mùa hè, các con ve có vi khuẩn tularemia trở nên tăng hoạt động. Trong suốt mùa săn bắn vào mùa đông, bệnh có thể mắc từ việc tiếp xúc với các con thỏ bệnh (thường từ việc lột da chúng).

Ai có thể mắc bệnh tularemia?

Bất kì ai cũng có thể mắc bệnh tularemia nếu họ dành nhiều thời gian ngoài trời ở những khu vực có ve nhiều. Các thợ săn đặc biệt có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh.

Tularemia lan truyền như thế nào?

Ve cắn là cách thức lan truyền bệnh tularemia đến người thường gặp nhất. Một cách thức khác mà con người có thể bị nhiễm bệnh tularemia là qua việc dính máu hoặc mô từ động vật nhiễm bệnh (đặc biệt là thỏ) vào trong mắt, miệng hoặc những vết đứt, trầy xước trên da của họ. Cầm nắm hoặc ăn thịt thỏ không nấu chín kĩ cũng có thể lan truyền tularemia. Mặc dù hiếm khi mắc bệnh từ việc cắn hoặc cào xước của động vật nhiễm bệnh, tularemia có thể lan truyền từ việc cầm vào da hoặc chân của động vật bệnh.

Tularemia có những triệu chứng gì?

Tularemia mắc phải từ vết ve cắn hoặc bởi nhiễm vi khuẩn này vào vết đứt hoặc trầy xước trên da thường có thể gây loét da và sưng hạch. Ăn hoặc uống những thức ăn và nước uống nhiễm vi khuẩn này có thể gây ra viêm họng, đau dạ dày, tiêu chảy và ói mửa. Hít bụi có chứa vi khuẩn này có thể gây bệnh giống viêm phổi. Sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau ngực, và ho có thể hiện diện.

Các triệu chứng xuất hiện sớm như thế nào?

Các triệu chứng hiện diện từ khoảng 1 đến 14 ngày, nhưng thường là sau 3-5 ngày.

Điều trị bệnh tularemia như thế nào?

Kháng sinh như streptomycin và gentamicin có thể được dùng để trị bệnh tularemia.

Một người có thể mắc lại bệnh tularemia không?

Sau khi phục hồi từ bệnh tularemia, một người có thể sẽ không mắc lại bệnh này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhiễm trùng lần hai có thể xảy ra.

Cần làm gì để ngăn chặn sự lan truyền của tularemia?

Mang găng tay khi lột da hoặc cầm động vật, đặc biệt là thỏ. Thịt thỏ dại và động vật gặm nhấm (như sóc) nên được nấu chín kỹ trước khi ăn. Loại bỏ bất kì các con ve đang bám trên người ngay khi phát hiện chúng. Dùng thuốc diệt ve và côn trùng khi ở ngoài trời. Giảm bất kì tiếp xúc với thú nuôi nhiễm ve của bạn.

Loại bỏ 1 con ve như thế nào?

Cần loại bỏ ve nhanh khi có thể. Cách tốt nhất là dùng nhíp để gấp ve và kéo nó thẳng lên khỏi da. Không nén vắt thân ve khi loại bỏ nó. Không cầm ve với tay không. Rửa tay bạn sau khi

loại bỏ ve. Bạn có thể thoa chất sát trùng nơi vết cắn. Nếu bệnh xuất hiện, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nói cho bác sĩ biết về việc một con ve đã cắn bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Văn phòng sức khỏe hạt, thành phố Oklahoma.

(405) 425-4437

Hiệu chỉnh 10/2008