

**4**



### Dosis de la mezcla de doxiciclina y agua combinada con alimento

1. Dé toda la mezcla de doxiciclina y agua con el alimento que hay en el segundo recipiente. Esta es una dosis.
2. Cada niño o adulto debe tomar 1 dosis en la mañana y 1 en la noche todos los días.

**5**

### Almacenamiento de la mezcla de doxiciclina y agua (si hay suficiente para otra dosis)

- Si le sobra suficiente mezcla de doxiciclina y agua para otra dosis, puede guardarla para la dosis siguiente.
- La mezcla de doxiciclina y agua se puede guardar en un recipiente o una taza cubiertos. Ponga una etiqueta con la fecha en el recipiente.
- Mantenga la mezcla en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Almacene la mezcla de doxiciclina y agua a la temperatura ambiente por hasta 24 horas.
- Deseche toda la mezcla no usada después de 24 horas y prepare una nueva mezcla de doxiciclina y agua antes de la dosis siguiente.



**No tome doxiciclina si es alérgico a las tetraciclinas.**

**Obtenga ayuda de emergencia si tiene cualquier señal de una reacción alérgica, como urticarias, dificultad para respirar o hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.**

La doxiciclina puede provocar diarrea, reacción de la piel al sol, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. Es posible que las píldoras anticonceptivas no tengan la misma eficacia si toma doxiciclina.

Informe sobre cualquier reacción al medicamento a MedWatch en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o al 1-800-FDA-1088.



# En una emergencia: Cómo preparar doxiciclina para niños y adultos que no puedan tragar tabletas

**Mezcla de hiclato de doxiciclina en tabletas de 100 mg con alimentos**

**Una vez que las autoridades federales, estatales o locales le hayan informado que necesita tomar doxiciclina debido a una emergencia de salud pública, puede ser necesario preparar las dosis de emergencia de doxiciclina para niños y adultos que no puedan tragar tabletas.**


Junio de 2008

Preparado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA)

## Suministros que necesitará

Necesitará estos artículos para preparar las dosis de doxiciclina para adultos y niños que no puedan tragar tabletas.

- 1 tableta de doxiciclina (100 mg) *(no tome doxiciclina si es alérgico a las tetraciclinas)*
- una cucharita de metal
- 2 recipientes pequeños
- agua
- uno de estos alimentos o bebidas para ocultar el sabor amargo de la doxiciclina molido:
  - leche o leche con chocolate
  - pudín de chocolate
  - jugo de manzana y azúcar



## Moler la tableta y mezclarla con agua



1. Coloque una tableta de doxiciclina en un recipiente pequeño.

2. Añada 4 cucharaditas de agua al mismo

recipiente.

3. Deje remojar la tableta en el agua durante

5 minutos a fin de que se ablande.

4. Use la parte posterior de una cucharita

de metal para moler la tableta en el agua.


Muela la tableta hasta que no queden

partes visibles.

5. Revuelva la tableta y el agua para que se

**Ahora usted ya ha hecho la mezcla de doxiciclina y agua.**

mezclen bien.



## Añadir alimentos a la mezcla de doxiciclina y agua para que sepa mejor

Peso del niño: \_\_\_\_\_

1. Pese a su hijo.

2. Encuentre el peso de su hijo en el lado izquierdo de la tabla siguiente.

3. Luego, busque en el lado derecho de la tabla la cantidad de mezcla de doxiciclina y agua para combinar con el alimento. La tabla muestra la cantidad que debe darle a su hijo para 1 dosis. *(Para una dosis de ½ cucharadita, llene la cucharita a la mitad. Es mejor dar un poco más del medicamento que menos.)*

Peso del niño	Cantidad de mezcla de doxiciclina y agua	Cucharaditas
12 libras o menos	½ cucharadita	
13 a 25 libras	1 cucharadita	
26 a 38 libras	1½ cucharaditas	
39 a 50 libras	2 cucharaditas	
51 a 63 libras	2½ cucharaditas	
64 a 75 libras	3 cucharaditas	
76 a 88 libras	3½ cucharaditas	
89 libras o más y adultos	Use la mezcla completa	

4. Añada la cantidad adecuada de mezcla de doxiciclina y agua que aparece en la tabla anterior en el segundo recipiente. Para adultos y niños de 89 libras o más, use toda la mezcla.

5. Añada 3 cucharaditas de leche o de jugo con chocolate o de pudín de chocolate o de jugo de manzana al segundo recipiente. Si usa jugo de manzana, agregue también 4 cucharaditas de azúcar en el segundo recipiente.

• Mezcle bien.

6. Vaya al paso 4 para conocer la dosis.

