

# Hoja de información acerca de la Amoxicilina

## Información para el paciente: Tabletas orales de 500 mg Amoxicilina Suspensión oral de Amoxicilina

Tome esta medicina como es recetada.

La amoxicilina pertenece a una clase de drogas llamadas antibióticos penicilina. Ha sido aprobada por la Administración de Comida y Drogas (ACD) y sus siglas en inglés (FDA) para tratar a las personas con infecciones causadas por ciertos tipos de bacteria. La Amoxicilina no ha sido aprobada por el (FDA) para ser usada cuando se trata de personas que han sido expuestas al ántrax. Sin embargo, si los resultados de las pruebas demuestran que la bacteria del ántrax puede eliminarse con penicilina (antibiótico), el uso de la amoxicilina es recomendado para prevenir el desarrollo de la enfermedad del ántrax en personas que han sido expuestas al mismo, cuando otros antibióticos no son seguros para usarse como en niños y mujeres embarazadas.

### Como tomar la amoxicilina

**ADULTOS:** Tome una pastilla tres veces al día.

**NIÑOS:** La dosis de un niño depende de su peso corporal. Dele la medicina a su niño como el doctor se lo indica.

Tome la amoxicilina con un vaso grande de agua. La medicina puede tomarse con o sin comida. Tomarla con comida disminuye la probabilidad de que ocurra malestar estomacal.

Si se le olvida tomar una dosis, principie otra vez tomando una pastilla tres veces al día. No tome dos pastillas para reponer la dosis olvidada. Termine todas sus pastillas, aunque se sienta bien, a menos que su doctor le diga que ya no las tome. Si deja de tomar esta medicina antes de tiempo, puede volver a enfermarse.





### **Efectos Secundarios**

Los efectos secundarios comunes de la amoxicilina incluyen malestar estomacal, vómitos, diarrea. Si usted tiene problema con alguno de estos síntomas, dígaselo a su doctor.

Las reacciones alérgicas son raras. Los signos de una reacción alérgica incluyen ronchas, picazón, edema (hinchazón de la lengua, manos o pies), fiebre o dificultad para respirar. Si alguno de estos síntomas ocurre, llame a su doctor inmediatamente.

#### **Precauciones**

- Asegúrese de decirle a su doctor si usted es alérgico a alguna medicina.
- Es muy importante decirle a su doctor acerca de TODAS las medicinas que está tomando actualmente incluyendo las que compra en la tienda como vitaminas y antiácidos.
- Dígale a su doctor si usted tiene asma, que es un problema respiratorio, u otra enfermedad. Las pastillas anticonceptivas puede ser que no funcionen muy bien cuando toma esta medicina. Asegúrese de usar condones o alguna otra forma de anticonceptivo hasta que haya terminado con el tratamiento completo.
- La amoxicilina es segura para tomarla cuando está embarazada pero asegúrese de que su doctor sepa si usted está embarazada.

En mujeres, la amoxicilina puede causar comezón y secreción vaginal comúnmente conocida como infección por hongos. Dígale a su doctor si esto ocurre.

Para más información comuníquese con el Departamento de Salud de la Ciudad y del Condado de Oklahoma al (405) 425-4437

