

Este folleto explica cómo preparar dosis de emergencia de

Ciprofloxacina

para bebés y niños expuestos al ántrax


*Una vez que usted haya sido notificado por las autoridades federales, estatales y locales que la población ha sido expuesto a ántrax, puede ser necesario que prepare las pastillas de ciprofloxacina para hacer algunas dosis de **emergencia** de ciprofloxacina para bebés y niños.*

Usted necesitará:

- Una pastilla de (1) 500 miligramos (mg) de ciprofloxacina
- Una cucharilla de metal
- Cucharas de medir [1 cucharilla; and ½ cucharilla]
(NOTA: las cucharas para medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Agua
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
 - almíbar de chocolate
 - mermelada de fresa
 - jugo de manzana

Direcciones:

1. Ponga una (1) tableta de ciprofloxacina de 500 mg. dentro del tazón. Agregue dos (2) cucharillas niveladas de agua. Mezcle el agua y la pastilla durante un minuto. Triture la pastilla con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vea pedazos grandes.



2. Agregue cuatro (4) cucharillas de una bebida o comida a la mezcla de ciprofloxacina y agua. Revuélvalas hasta que la droga esté bien disuelta.



Cuánta mezcla de ciprofloxacina hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina suministrada al niño depende del peso del niño. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla explica cuánta dosis de Ciprofloxacina se debe dar al niño de acuerdo con su peso. Debe de suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde.)

| Si el niño pesa | Suministre |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4 - 6.5 libras | Media (1/2) cucharilla de la mezcla de ciprofloxacina |
| 7 - 12.5 libras | Una (1) cucharilla de la mezcla de ciprofloxacina |
| 13 - 18.5 libras | Una cucharilla y media (1 ½) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 19 - 24.5 libras | Dos (2) cucharillas (tsp) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 25 - 30.5 libras | Dos cucharillas y media (2 ½) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 31 - 37 libras | Tres (3) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina |
| 37.5 – 43 libras | Tres cucharillas y media (3 ½) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 43 - 49 libras | Cuatro (4) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina |
| 49.5 – 55 libras | Cuatro cucharillas y media (4 ½) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 55.5 - 61.5 libras | Cinco (5) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina |
| 62 - 67.5 libras | Cinco cucharillas y media (5 ½) de la mezcla de ciprofloxacina |
| 68 - 73.5 libras | Seis (6) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina |

Niños que pesan más de 73.5 libras que han sido expuestos al ántrax deben tomar uno (1) pastilla de 500 mg. de ciprofloxacina dos veces diarias (a la misma hora del día, si es posible) durante 60 días.

Como se debe almacenar la mezcla de ciprofloxacina preparada

- Ciprofloxacina mezclada con cualquiera de las bebidas o comidas recomendadas se mantendrá fresca por lo menos 24 horas.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto dentro de la nevera.
- Las mezclas hechas con jugos pueden ser guardadas a la temperatura ambiente.

