

Esta hoja explica cómo preparar dosis de emergencia de

Ciprofloxacina para bebés y niños expuestos al **plaga**

*Una vez que usted haya sido notificado por las autoridades federales, estatales y locales que la población ha sido expuesto al **plaga**, puede ser necesario que tenga que preparar dosis de emergencia de ciprofloxacina para infantes y niños usando tabletas de ciprofloxacina.*

Usted necesitará:

- Una tableta de (1) 500 miligramos (mg) de ciprofloxacina
- Una cucharilla de metal
- Cucharas para medir [1 cucharilla; and ½ cucharilla]
(NOTA: las cucharas para medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
 - almíbar de chocolate
 - almíbar de caramelo
 - salsa de tomate o ketchup

Direcciones:

1. Ponga una (1) tableta de ciprofloxacina de 500 mg. dentro del tazón. Triture la tableta con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vean pedazos grandes.



2. Agregue seis (6) cucharillas niveladas de comida a Ciprofloxacina triturada. Revuélvalas hasta que la droga esté bien mezclada.



Cuánta mezcla de ciprofloxacina hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina suministrada al niño depende del peso del niño. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla explica cuánta dosis de ciprofloxacina se debe dar al niño de acuerdo con su peso. Debe de suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde) por 7 días.

Si el niño pesa	Suministre
4 – 5 libras	Media (1/2) cucharilla de la mezcla de ciprofloxacina (2.5 ml)
5.5 - 10 libras	Una (1) cucharilla de la mezcla de ciprofloxacina (5 ml)
11 - 15 libras	Una cucharilla y media (1 ½) de la mezcla de ciprofloxacina (7.5 ml)
16 - 20 libras	Dos (2) cucharillas (tsp) de la mezcla de ciprofloxacina (10 ml)
21 - 25 libras	Dos cucharillas y media (2 ½) de la mezcla de ciprofloxacina (12.5 ml)
26 - 30 libras	Tres (3) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina (15 ml)
31 – 35 libras	Tres cucharillas y media (3 ½) de la mezcla de ciprofloxacina (17.5 ml)
36 - 40 libras	Cuatro (4) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina (20 ml)
41 – 45 libras	Cuatro cucharillas y media (4 ½) de la mezcla de ciprofloxacina (22.5 ml)
46 - 50 libras	Cinco (5) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina (25 ml)
51 – 55 libras	Cinco cucharillas y media (5 ½) de la mezcla de ciprofloxacina (27.5 ml)
56 – 60 libras	Seis (6) cucharillas de la mezcla de ciprofloxacina (30 ml) (1 tableta)

Niños que pesan más de 60 libras que han sido expuestos al plaga deben tomar uno (1) tableta de 500 mg. de ciprofloxacina dos veces diarias (a la misma hora del día, si es posible) por 7 días. Si su niño no puede tragar las tabletas. Use las instrucciones para preparar la mezcla y dele 6 cucharaditas dos veces al día.

Como se debe almacenar la mezcla de ciprofloxacina preparada

- Prepare la mezcla diariamente.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto y refrégerelo.
- Puede mantener la mezcla por lo menos 24 horas refrigerada.
- Descarte las porciones no usadas.

