



Preparacion casera de dosis de emergencia de

Clindamycin

Para bebes y ninos expuestos a antrax

Una ves que usted ha sido notificado por las autoridades federales, estatales, o locales que ha sido expuesto a antrax, va a ser necesario preparar dosis de emergencia de clindamicina para bebes y niños usando tabletas de clindamicina.

Puede necesitar:

- Una (1) tableta de 300 miligramos (mg) de Clindamicina
- Cuchara de metal
- Cucharas de medidas [1 cucharadita (tsp); and ½ cucharadita(tsp)]
(NOTA se prefieren las cucharas medidoras, como sea si no las tiene a la mano, use la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 recipiente pequeño.
- Uno de estos alimentos
 - Jarabe de chocolate
 - Jarabe de arce(maple)
 - Jarabe de caramelo
 - cátsup

Instrucciones:

1. Ponga (1) tableta de 300-mg de Clindamicina en un recipiente pequeño. Triture la tableta con la parte trasera de la cuchara de metal hasta que no se vean pedazos grandes.



2. Agregue (6) cucharaditas rasas (tsp) de alimento a la tableta triturada de clindamicina . Agítelos juntos hasta que la medicina este mezclada con el alimento.



Cuanta Mezcla de Clindamicina Administrar Al Niño

El numero de cucharadas de mezcla de clindamicina para el niño depende de su peso. **Si no sabe el peso del niño, péselo antes de darle la primera dosis.** La tabla nos dice cual es la dosis para el niño. Debe darle dos dosis cada día (una en la mañana y otra en la noche) **por 60 días.**

Si el niño pesa	Administrar al niño
Arriba de 16 libras (lbs.)	Media (1/2) cucharadita (tsp) (2.5mL) de la mezcla de Clindamicina
17 - 33 (lbs.)	Una (1) cucharadita (5mL) de la mezcla de Clindamicina
34 – 50 (lbs.)	Una y media (1 ½) cucharaditas (7.5mL) de la mezcla de Clindamicina
51 - 66 (lbs.)	Dos (2) cucharaditas (10mL) de la mezcla de Clindamicina
67 – 82 (lbs.)	Dos y media (2 ½) cucharaditas (12.5mL) de la mezcla de Clindamicina
83 - 99 (lbs.)	Tres(3) cucharaditas (15mL) de la mezcla de Clindamicina
100 – 115 (lbs.)	Tres y media (3 ½) cucharaditas (17.5mL) de la mezcla de Clindamicina
116 - 132 (lbs.)	Cuatro (4) cucharaditas (20mL) de la mezcla de Clindamicina
133 – 148 (lbs.)	Cuatro y media (4 ½) cucharaditas (22.5mL) de la mezcla de Clindamicina
149 - 165 (lbs.)	Cinco (5) cucharaditas (25mL) de la mezcla de Clindamicina
166 – 181 (lbs.)	Cinco y media (5 ½) cucharaditas (27.5mL) de la mezcla de Clindamicina
182 - 198 (lbs.)	Seis (6) cucharaditas (30mL) de la mezcla de Clindamicina (o 1 tableta)

Niños mas pesados de 198 libras expuestos a antrax deben tomar (1) tableta de 300-mg de Clindamicina dos veces al día (a la misma hora cada día si es posible) **por 60 días.** Si el niño no puede tragar tabletas, siga las instrucciones para preparar la mezcla y dele 6 cucharaditas dos veces al día.

Como debe ser almacenada la mezcla de Clindamicina

- Prepare la mezcla de Clindamicina diariamente; almacénela en un recipiente con tapa en el refrigerador. La mezcla se mantiene por al menos 24 horas refrigerada.
- Tire las porciones que no use.

