



Preparación en el hogar para dosis de emergencia de
levofloxacino
 para los bebés y niños expuestos al **ántrax**

Una vez que las autoridades federales, estatales o locales le hayan notificado que ha estado expuesto al ántrax, puede ser necesario preparar dosis de emergencia de levofloxacino para los bebés y niños que utilicen comprimidos de levofloxacino.

Necesitará:

- Un (1) comprimido de 750 miligramos (mg) de levofloxacino
- Cucharilla de metal
- Cucharas medidoras [1 cucharadita (cdta.) y ½ cucharadita (cdta.)]
 (NOTA: Es preferible utilizar cucharas medidoras; sin embargo, si no se dispone de ellas, use la cuchara de metal para moler, medir y administrar el medicamento)
- 1 tazón pequeño
- Uno de estos alimentos
 - Compota de manzana Budín de chocolate
 - Jarabe de chocolate Jarabe de arce
 - Jarabe de caramelo Kétchup

Indicaciones:

1. Coloque un (1) comprimido de levofloxacino de 750 mg en un tazón pequeño. Triture el comprimido con la parte posterior de la cuchara de metal hasta que no se vean trozos grandes.



2. Agregue seis (6) cucharaditas (cdtas.) al ras de un alimento al levofloxacino triturado. Revuelva hasta que el medicamento se mezcle de manera uniforme con el alimento.



Cantidad de mezcla de levofloxacino que se debe administrar a un niño
 La cantidad de cucharaditas de la mezcla de levofloxacino que se debe administrar a un niño depende de su peso. **Si se desconoce el peso del niño, péselo antes de administrarle la primera dosis.** La tabla le indica la cantidad que debe darle al niño por una dosis. Debe administrarle al niño dos dosis al día (una por la mañana y otra por la noche, con un intervalo de 12 horas) **durante 60 días.**

Si el niño pesa	Dele al niño
Hasta 19 libras (lb.)	Media (1/2) cucharadita (2,5 ml) de la mezcla de levofloxacino
20 - 41 (lb.)	Una (1) cucharadita (5 ml) de la mezcla de levofloxacino
42 – 57 (lb.)	Una cucharadita y media (1 ½) (7,5 ml) de la mezcla de levofloxacino
58 – 110 (lb.)	Dos (2) cucharaditas (10 ml) de la mezcla de levofloxacino

Los niños que pesen más de 110 libras y estén expuestos al ántrax deben tomar 4 cucharaditas UNA VEZ al día (a la misma hora todos los días, si es posible) **durante 60 días.**

¿Cómo se debe conservar la mezcla de levofloxacino ya preparada?

- Prepare la mezcla de levofloxacino todos los días. Guárdela en un recipiente cerrado y refrigérela. La mezcla se conservará refrigerada durante al menos 24 horas.
- Deseche las porciones que no use.

