



Preparación en casa de dosis de emergencia de
Amoxicilina
 para bebés y niños expuestos al **ántrax**

Una vez que sus autoridades federales, estatales o locales le hayan notificado que usted ha estado expuesto al ántrax, es posible que sea necesario preparar dosis de **emergencia** de amoxicilina para bebés y niños que tomen tabletas de amoxicilina.

Usted necesitará:


- Una (1) tableta de 500 miligramos (mg) de amoxicilina
- Una cucharadita de metal
- Cucharas de medir [1 cucharadita (tsp) y ½ cucharadita (tsp)]
 (NOTA: Es preferible usar cucharas de medir. Sin embargo, si no las tiene a su disposición, use una cucharilla de metal para moler, medir y dar la medicina)
- Un (1) tazón pequeño
- Uno de estos alimentos:
 - Chocolate, caramelo o jarabe de arce
 - Puré de manzana
 - Pudín

Indicaciones:

1. Coloque una (1) tableta de amoxicilina de 500 mg en un tazón pequeño. Triture la tableta con la parte posterior de la cuchara de metal hasta que no sean visibles los pedazos grandes.



2. Agregue cuatro (4) cucharaditas (tsp) de un alimento a la amoxicilina triturada. Revuélvalos hasta que la droga se vea mezclada con la comida.



¿Qué cantidad de la mezcla de amoxicilina le debe dar a un niño?

El número de cucharaditas de la mezcla de amoxicilina que se le debe administrar a un niño depende del peso de este. **Si se desconoce el peso del niño, péselo antes de administrar la primera dosis.** La tabla le indica cuánto le debe dar a un niño en **una dosis**. Debe darle al niño **tres dosis por día** (una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche) **durante 60 días**.

Si el niño pesa	Dele al niño
4-7 libras o menos	Media (1/2) cucharadita (2.5 ml) de la mezcla de amoxicilina
8-11 libras	Una (1) cucharadita (5ml) de la mezcla de amoxicilina
12-17 libras	Una cucharadita y media (1 ½) (7.5 ml) de la mezcla de amoxicilina
18-22 libras	Dos (2) cucharaditas (10 ml) de la mezcla de amoxicilina
23-27 libras	Dos cucharaditas y media (2 ½) (12.5 ml) de la mezcla de amoxicilina
28-33 libras	Tres (3) cucharaditas (15 ml) de la mezcla de amoxicilina
34-38 libras	Tres cucharaditas y media (3 ½) (17.5 ml) de la mezcla de amoxicilina
39-44 libras	Cuatro (4) cucharaditas (20 ml) de la mezcla de amoxicilina
45-55 libras	Cinco (5) cucharaditas (25 ml) de la mezcla de amoxicilina
56-66 libras	Seis (6) cucharaditas (30 ml) de la mezcla de amoxicilina
67-77 libras	Siete (7) cucharaditas (35 ml) de la mezcla de amoxicilina
78-88 libras o más	Ocho (8) cucharaditas (40 ml) de la mezcla de amoxicilina

Para niños que puedan tragar tabletas

Los niños que pesen **entre 39 y 49 libras** deben tomar **una (1) tableta de 500 mg** de amoxicilina tres veces al día.

Los niños que pesen **entre 45 y 66 libras** deben tomar **una tableta y media (1 ½) de 500 mg** de amoxicilina tres veces al día.

Los niños que pesen **entre 67 y 88 libras o más** deben tomar **dos (2) tabletas de 500 mg** de amoxicilina tres veces al día.

Si el niño no puede tragar las tabletas, siga las instrucciones para preparar una mezcla y proporcione la cantidad indicada en la tabla de arriba.

Cómo debe guardarse la mezcla de amoxicilina ya preparada

- Prepare la mezcla de amoxicilina diariamente. Guarde la mezcla en un recipiente tapado y refrigere. La mezcla se mantendrá refrigerada durante 24 horas.
- Es posible que deba prepararse más de una porción de la mezcla para hacer todas las dosis necesarias. Por cada tableta triturada, agregue cuatro (4) cucharaditas de comida.
 - Un peso de 12-27 libras requiere dos (2) tabletas y ocho (8) cucharaditas de comida.
 - Un peso de 28-44 libras requiere tres (3) tabletas y doce (12) cucharaditas de comida.
 - Un peso de 45-55 libras requiere cuatro (4) tabletas y dieciséis (16) cucharaditas de comida.
 - Un peso de 56-66 libras requiere cinco (5) tabletas y veinte (20) cucharaditas de comida.
 - Un peso de 67-88 libras requiere seis (6) tabletas y veinticuatro (24) cucharaditas de comida.
- Deseche todas las porciones no utilizadas después de administrar la última dosis del día.

