

The nay giai thich cach pha che luong thuoc khan cap cua
Ciprofloxacin
cho cac be tho va tre em bi nguy hiem ve **plague/dich hach**

Khi ban duoc thong bao boi lien bang, tieu bang, hay chinh quyen dia phuong rang ban bi nguy hiem ve dich hach, dieu can thiet la pha che **khan cap** luong thuoc cua ciprofloxacin cho cac be tho va tre em, dung cac vien ciprofloxacin.

Ban se can:

- Mot (1) vien ciprofloxacin 500 milligram (mg)
- Muong tra kim loai
- Muong phan luong (1 muong tra; va ½ muong tra)
(GHI CHU muong luong thuoc duoc cap, tuy nhien neu khong co san, hay dung muong kim loai de nghien, do luong va cho uong thuoc)
- 1 chen nho
- Mot trong cac thuc pham nay
 - Nuoc ngot socola
 - Nuoc ngot cua maple/cay thich
 - Nuoc ngot caramel/duong thang
 - Ketchup/sot ca chua

Huong Dan:

1. De mot (1) vien ciprofloxacin 500-mg vao mot cai chen nho. Nghien nat vien thuoc bang phan lung cua cai muong kim loai cho den khi khong con thay cac manh thuoc lon.

2. Them sau (6) muong tra cua thuc pham vao ciprofloxacin nghien nat. Khuay deu cho den khi thuoc hoa tan voi thuc pham.

Bao nhiêu Ciprofloxacin Hòn hóp Cho một Dừa tre

Số muỗng tra của ciprofloxacin hòn hóp cho một dừa tre tùy thuộc vào sức nặng của dừa tre, ***Neu không biết sức nặng của dừa tre, hãy cân dừa tre trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.*** Biểu đồ dưới đây bao nhiêu trong một muỗng thuốc cho dừa tre. Bạn nên cho dừa tre **hai muỗng thuốc** mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi tối) **đến 7 ngày.**

Neu dừa be can	Cho dừa be
4 – 5 can (lbs)	một nửa (1/2) muỗng tra (2.5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
5.5 – 10 (lbs)	một (1) muỗng tra (5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
11 – 15 (lbs)	một và một nửa (1 ½) muỗng tra (7.5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
16 – 20 (lbs)	hai (2) muỗng tra (10ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
21 – 25 (lbs)	hai và một nửa (2 ½) muỗng tra (12.5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
26 – 30 (lbs)	ba (3) muỗng tra (15ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
31 – 35 (lbs)	ba và một nửa (3 ½) muỗng tra (17.5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
36 – 40 (lbs)	bốn (4) muỗng tra (20ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
41 – 45 (lbs)	bốn và một nửa (4 ½) muỗng tra (22.5ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
46 – 50 (lbs)	năm (5) muỗng tra (25ml) của Ciprofloxacin hòn hóp
51 – 55 (lbs)	năm và một nửa (5 ½) muỗng tra (27.5) của Ciprofloxacin hòn hóp
56 – 60 (lbs)	sáu (6) muỗng tra (30ml) của Ciprofloxacin hòn hóp

Các em nặng hơn 60 cân bị nguy hiểm về dịch hạch nên uống một (1) viên ciprofloxacin 500-mg hai lần mỗi ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 7 ngày.** Nếu bé không thể nuốt trong được những viên thuốc, hãy dùng cách hướng dẫn pha chế một hòn hóp và cho uống 6 muỗng tra hai lần một ngày.

Cách Nén giu hòn hóp Ciprofloxacin đã được pha chế

- Pha chế hòn hóp Ciprofloxacin mỗi ngày, giu hòn hóp trong vát chừa đáy bọc kín trong tủ lạnh. Hòn hóp được giu lạnh ít nhất 24 giờ.
- Bỏ đi những phần không sử dụng.

