



Ciprofloxacin - Tờ Thông Tin

Ciprofloxacin là gì?

Ciprofloxacin, thường được gọi là cipro, thuộc nhóm thuốc tên là kháng sinh quinolone. Nó đã được chấp thuận bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để điều trị và bảo vệ những người đã tiếp xúc với bào tử bệnh than. Ciprofloxacin thường được cung cấp trong một viên uống 500 mg hoặc như một hỗn dịch uống cho trẻ em.

Làm thế nào để dùng cipro?

Người lớn: Uống 1 viên mỗi 12 tiếng theo chỉ dẫn. Mỗi người nên uống tất cả các viên thuốc trong chai của họ.

Trẻ em: Liều của trẻ tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể. Cung cấp thuốc cho con bạn theo hướng dẫn trên tài liệu bổ sung dùng thuốc.

Tốt nhất là uống cipro 2 giờ trước hoặc sau bữa ăn với ít nhất một ly nước lớn. Tuy nhiên, nếu dạ dày xảy ra khó chịu, cipro có thể uống cùng với thức ăn. Tránh các sản phẩm từ sữa như sữa và sữa chua trong ít nhất 3 giờ trước và sau khi uống thuốc. Nếu bạn uống vitamin hoặc thuốc kháng acid như Tums hoặc Maalox, hãy uống vitamin hoặc thuốc kháng acid 6 giờ trước hoặc 2 giờ sau khi uống cipro.

Cipro liều lượng trong một cuộc tấn công bệnh than:

Ban đầu, quá trình 10 ngày sẽ được cung cấp cho tất cả các cá nhân có thể đã tiếp xúc với bệnh than. Một quá trình bổ sung 50 ngày của cipro sẽ được cung cấp cho các cá nhân đã được xác định là trực tiếp tiếp xúc với tấn công bệnh than.

Phải làm gì nếu bạn bỏ lỡ một liều?

Nếu bạn bỏ lỡ một liều, bắt đầu dùng một viên mỗi 12 giờ. Đừng dùng 2 viên thuốc để bù cho liều đã quên. Uống hết tất cả các thuốc của bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy ổn, trừ khi bác sĩ bảo bạn ngừng. Nếu bạn ngừng dùng thuốc quá sớm, bạn có thể bị bệnh.

OCCHD.ORG |  **Facebook** - Search OKC-County Health or @OCCHD

OCCHD App - Search OCCHD on the Apple Store



or **Google Play**





Ciprofloxacin - Tờ Thông Tin

Tác dụng phụ của cipro?

Tác dụng phụ thường gặp của cipro bao gồm đau dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, chóng mặt hoặc đau đầu. Nếu bạn có vấn đề với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói với bác sĩ của bạn. Tác dụng phụ ít phổ biến hơn bao gồm đau hoặc ngứa ran ở cánh tay và/hoặc chân, thay đổi thị lực, bồn chồn, đồ chuông trong tai, viêm gân, vỡ gân hoặc thay đổi về tinh thần. Nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra, hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn. **Phản ứng dị ứng nặng là rất hiếm.** Các dấu hiệu của một phản ứng dị ứng bao gồm phát ban, ngứa, sưng lưỡi, bàn tay hoặc bàn chân, sốt hoặc khó thở. Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra, hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn.

Ghi chú đặc biệt cho trẻ em: Thuốc này có thể gây ra các vấn đề về khớp ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu con bạn bị đau khớp khi đang dùng cipro, hãy nói với bác sĩ của bạn.

Sự đề phòng:

Hãy chắc chắn cho bác sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào. Nó là rất quan trọng để nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn đang dùng ngay cả thuốc đã được mua tại các cửa hàng như vitamin và thuốc kháng acid. Cho bác sĩ biết nếu bạn đã từng bị co giật, đột quỵ hoặc các vấn đề về thận, khớp hoặc gân, gan hoặc thị lực của bạn. Báo cáo bất kỳ tiền sử chảy máu bất thường hoặc bầm tím nào. - Nếu thuốc này khiến bạn chóng mặt, hãy thận trọng khi lái xe hoặc thực hiện các công việc yêu cầu bạn phải tỉnh táo. Tránh rượu trong trường hợp này vì nó sẽ làm cho chóng mặt tồi tệ hơn. Cipro có thể làm cho da rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ bị cháy nắng nặng. Tránh ánh nắng càng nhiều càng tốt. Khi ra ngoài, mặc áo dài tay và đội mũ và luôn thoa kem chống nắng (30 SPF). Ở phụ nữ, cipro có thể gây ngứa âm đạo và tiết dịch được gọi là nhiễm nấm men. Cho bác sĩ của bạn biết nếu điều này xảy ra. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hãy nói với bác sĩ của bạn. Vì sự an toàn của cipro trong thai kỳ chưa được biết. Nếu bạn đang mang thai hoặc sẽ mang thai, hãy nói với bác sĩ của bạn. Cipro có thể làm tăng tác dụng của caffeine và theophylline (một loại thuốc).

—
Để biết thêm thông tin, liên hệ với Oklahoma City-County Health Department tại (405) 425-4437

OCCHD.ORG



Facebook - Search OKC-County Health or @OCCHD

OCCHD App - Search OCCHD on the Apple Store



or Google Play





OCCHD.ORG |  **Facebook** - Search OKC-County Health or @OCCHD

OCCHD App - Search OCCHD on the Apple Store  or Google Play 