

Thẻ này giải thích cách pha chế lượng thuốc khẩn cấp của  
**DOXYCYCLINE**  
cho bé thỏ và trẻ em bị nguy hiểm về **plague/dịch hạch**

Một khi bạn được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương rằng bạn đã bị nguy hiểm về dịch hạch, điều cần thiết là pha chế lượng thuốc khẩn cấp từ các viên doxycycline cho bé thỏ và trẻ em.

**Bạn sẽ cần:**

- một (1) viên doxycycline 100 milligram (mg)
- muỗng trà kim loại
- muỗng đo lường (1 muỗng trà; và  $\frac{1}{2}$  muỗng trà  
(GHÌ CHỦ muỗng đo lường được cấp, tuy nhiên nếu không có sẵn, dùng muỗng kim loại để nghiên, đo lường và cho uống thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một trong những thực phẩm này
  - nước ngọt sôcôla
  - nước ngọt maple/cây thích
  - nước ngọt đường thăng/caramel
  - sốt trái táo

**Hướng dẫn:**

1. Đặt một (1) viên doxycycline 100-mg vào trong chén nhỏ. Nghiền viên thuốc với phần lửng của muỗng kim loại cho đến khi không còn thấy nhung mảnh lớn.



2. Thêm bốn (4) muỗng trà bằng phẳng của thực phẩm vào doxycycline nghiên nát. Khuấy trộn đều cho đến khi không còn thấy nhung mảnh lớn.



## Bao nhiêu Doxycycline Hỗn hợp để Cho một Em bé

Số muỗng trà của hỗn hợp doxycycline để cho một em bé tùy thuộc vào sức nặng của bé. *Nếu sức nặng của bé không được biết, hay cần bé trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.* Biểu đồ định bao nhiêu trong một lượng thuốc cho bé. Bạn nên cho bé *hai lượng thuốc* mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi chiều) **đến 7 ngày**.

Neu be cần	Cho bé
4 – 11 cân (lbs)	một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Doxycycline hỗn hợp
12 – 22 (lbs)	một (1) muỗng trà (5ml) của Doxycycline hỗn hợp
23 -33 (lbs)	một và một nửa (1 ½) muỗng trà (7.5ml) của Doxycycline hỗn hợp
34 – 45 (lbs)	hai (2) muỗng trà (10ml) của Doxycycline hỗn hợp
46 – 55 (lbs)	hai và một nửa (2 ½) muỗng trà (12.5ml) của Doxycycline hỗn hợp
56 – 65 (lbs)	ba (3) muỗng trà (15ml) của Doxycycline hỗn hợp
66 – 77 (lbs)	ba và một nửa (3 ½) muỗng trà (17.5ml) của Doxycycline hỗn hợp
78 -88 (lbs)	bốn (4) muỗng trà (20ml) của Doxycycline hỗn hợp (hay 1 viên)

Các em nặng hơn 88 cân bị nguy hiểm về dịch hạch nên uống một (1) viên doxycycline 100-mg hai lần một ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 7 ngày**. Nếu bé không thể nuốt trọng nhưng viên thuốc, dùng cách hướng dẫn pha chế hỗn hợp và cho uống bốn (4) muỗng trà hai lần một ngày.

### Cách nén giữ hỗn hợp doxycycline đã được pha chế

- Pha chế hỗn hợp doxycycline mỗi ngày; giữ trong vật chứa dày kín trong tủ lạnh.
- Doxycycline trộn lẫn với bất cứ thực phẩm nào được đề nghị sẽ giữ lâu ít nhất 24 giờ.
- Bỏ đi các phần không dùng.