



Chuẩn bị tại nhà liều khẩn cấp

Levofloxacin

cho trẻ sơ sinh và trẻ em phơi nhiễm **bệnh than**

Ngay sau khi nhận được thông báo của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc tại địa phương rằng quý vị đã phơi nhiễm với bệnh than, quý vị có thể sẽ cần chuẩn bị một số liều Levofloxacin **khẩn cấp** cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới dạng viên Levofloxacin.

Quý vị sẽ cần:

- Một (1) viên Levofloxacin 750 miligram (mg)
- Thìa cà phê bằng kim loại
- Thìa đong [1 thìa cà phê (tsp); và ½ thìa cà phê (tsp)]
(LƯU Ý sử dụng thìa đong nếu muốn, tuy nhiên nếu không có sẵn thì có thể sử dụng thìa kim loại để nghiền, đo và sử dụng thuốc)
- 1 chiếc bát nhỏ
- Một trong những thực phẩm sau
 - Sốt táo Bánh pudding sô cô la
 - Si rô sô cô la Si rô lá phong
 - Si rô caramel Tương cà

Hướng dẫn:

1. Đặt một (1) viên Levofloxacin 750-mg vào một chiếc bát nhỏ. Dùng phần lưng của thìa kim loại để nghiền nhỏ toàn bộ viên thuốc.



2. Thêm sáu (6) thìa cà phê (tsp) một loại thực phẩm ở trên vào Levofloxacin đã nghiền vụn. Trộn cho đến khi thuốc và thực phẩm quyện vào nhau.



Trẻ Em Cần Sử Dụng Bao Nhiêu Hỗn Hợp Levofloxacin

Số thìa cà phê Levofloxacin dùng cho trẻ phụ thuộc vào cân nặng của trẻ. **Nếu không biết cân nặng của trẻ, hãy cân trước khi cho trẻ dùng liều đầu tiên.** Thông tin trong bảng sẽ cho quý vị biết một liều cho trẻ là bao nhiêu. Quý vị nên cho trẻ dùng hai liều mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi tối, cách nhau 12 giờ) **trong vòng 60 ngày.**

Nếu trẻ nặng	Cho trẻ dùng
Từ 19 pound (lbs.) trở xuống	Một nửa (1/2) thìa cà phê (2.5mL) hỗn hợp Levofloxacin
20 - 41 (lbs.)	Một (1) thìa cà phê (5mL) hỗn hợp Levofloxacin
42 - 57 (lbs.)	Một thìa rưỡi (1 ½) (7.5mL) hỗn hợp Levofloxacin
58 - 110 (lbs.)	Hai (2) thìa cà phê (10mL) hỗn hợp Levofloxacin
Với trẻ có cân nặng trên 110 pound bị phơi nhiễm bệnh than thì cần dùng 4 thìa cà phê MỘT LẦN mỗi ngày (vào cùng thời điểm trong ngày nếu có thể) trong vòng 60 ngày.	

Cách bảo quản hỗn hợp Levofloxacin đã chuẩn bị sẵn

- Chuẩn bị hỗn hợp Levofloxacin hàng ngày; bảo quản hỗn hợp trong hộp kín và cất trong tủ lạnh. Để hỗn hợp trong tủ lạnh ít nhất 24 giờ.
- Bỏ đi nếu dùng xong và còn thừa.

F-17

