

Amoxicillin

khẩn cấp tại nhà cho trẻ sơ sinh và trẻ em bị phơi nhiễm với **bệnh than**

*Khi bạn được chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương thông báo rằng bạn bị phơi nhiễm với bệnh than, bạn có thể cần phải chuẩn bị các liều Amoxicillin **khẩn cấp** cho trẻ sơ sinh và trẻ em sử dụng các viên Amoxicillin.*

Bạn sẽ cần:


- Một (1) viên Amoxicillin 500 milligram (mg)
- Thìa kim loại
- Các thìa đo [1 thìa cà phê (tsp); và ½ thìa cà phê (tsp)]
(LƯU Ý: cần ưu tiên sử dụng thìa đo, tuy nhiên nếu không có sẵn, sử dụng thìa kim loại để nghiền, đong và cho thuốc)
- 1 bát nhỏ
- Một trong những loại thức ăn sau
 - Sô cô la/Caramen/Si-rô cây phong
 - Sốt táo
 - Bánh Pudding

Hướng dẫn:

1. Cho một (1) viên Amoxicillin 500mg vào một cái bát nhỏ. Nghiền nát viên thuốc bằng mặt sau của thìa kim loại.



2. Thêm bốn (4) thìa cà phê một loại thức ăn trên vào Amoxicillin đã nghiền nát. Khuấy chúng với nhau cho đến khi thuốc hòa lẫn với thức ăn.



Cần cung cấp bao nhiêu hỗn hợp Amoxicillin cho một đứa trẻ

Số lượng thìa cà phê hỗn hợp amoxicillin cho một đứa trẻ phụ thuộc vào cân nặng của đứa trẻ đó. **Nếu không biết cân nặng của đứa trẻ, hãy cân trẻ trước khi sử dụng liều đầu tiên.** Bảng sau sẽ cho bạn biết cần bao nhiêu cho **một liều** cho một đứa trẻ. Bạn nên cho trẻ uống **ba liều mỗi ngày** (một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều và một lần vào buổi tối) **trong 60 ngày.**

Cân nặng của trẻ	Liều dùng cho trẻ
4-7 pounds hoặc nhỏ hơn	Một nửa (1/2) thìa cafe (tsp) (2.5mL) hỗn hợp Amoxicillin
8-11 pounds	Một (1) thìa cafe (5mL) hỗn hợp Amoxicillin
12-17 pounds	Một thìa rưỡi (1 ½) (7.5mL) hỗn hợp Amoxicillin
18-22 pounds	Hai (2) thìa cafe (10mL) hỗn hợp Amoxicillin
23-27 pounds	Hai thìa rưỡi (2 ½) (12.5mL) hỗn hợp Amoxicillin
28-33 pounds	Ba (3) thìa cafe (15mL) hỗn hợp Amoxicillin
34-38 pounds	Ba thìa rưỡi (3 ½) (17.5mL) hỗn hợp Amoxicillin
39-44 pounds	Bốn (4) thìa cafe (20mL) hỗn hợp Amoxicillin
45-55 pounds	Năm (5) thìa cafe (25mL) hỗn hợp Amoxicillin
56-66 pounds	Sáu (6) thìa cafe (30mL) hỗn hợp Amoxicillin
67-77pounds	Bảy (7) thìa cafe (35mL) hỗn hợp Amoxicillin
78-88 pounds hoặc lớn hơn	Tám (8) thìa cafe (40mL) hỗn hợp Amoxicillin

Dành cho trẻ có thể nuốt cả viên

Trẻ có cân nặng từ **39-49 pounds** nên uống **một viên (1) 500mg** amoxicillin ba lần một ngày

Trẻ có cân nặng từ **45-66 pounds** nên uống **một viên rưỡi (1 ½) 500mg** amoxicillin ba lần mỗi ngày

Trẻ có cân nặng từ **67-88 pounds or greater** nên uống **hai viên (2) 500mg** amoxicillin ba lần một ngày

Nếu trẻ không thể nuốt cả viên, hãy sử dụng các hướng dẫn để chuẩn bị hỗn hợp và cung cấp liều lượng được liệt kê như bảng trên

Nên bảo quản hỗn hợp Amoxicillin như thế nào

- Chuẩn bị hỗn hợp Amoxicillin hàng ngày; bảo quản hỗn hợp trong bình chứa có nắp và làm lạnh. Hỗn hợp sẽ được giữ lạnh trong 24 giờ.
- Có thể cần chuẩn bị nhiều hơn một phần hỗn hợp để làm tất cả các liều cần thiết. Đối với mỗi viên đã nghiền nát, thêm vào bốn (4) thìa cà phê thức ăn.
 - 12-27 pounds yêu cầu hai (2) viên; tám (8) thìa cà phê thức ăn
 - 28-44 pounds yêu cầu ba (3) viên; mười hai (12) thìa cà phê thức ăn
 - 45-55 pounds yêu cầu bốn (4) viên; mười sáu (16) thìa cà phê thức ăn
 - 56-66 pounds yêu cầu năm (5) viên; hai mươi (20) thìa cà phê thức ăn
 - 67-88 pounds yêu cầu sáu (6) viên; hai mươi bốn (24) thìa cà phê thức ăn
- Vứt bỏ các phần không sử dụng sau khi dùng liều cuối cùng trong ngày

