

Thẻ này giải thích cách cho uống những liều thuốc khẩn cấp của Tamiflu (oseltamivir) Suspension.

Tamiflu (oseltamivir) Suspension

Cho việc ngừa cúm/influenza ở các bé thơ và trẻ em

Một khi bạn đã được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chánh quyền địa phương của bạn rằng bạn đã bị đặt vào tình thế dễ bị cúm/influenza, có thể cần cho các bé thở và trẻ em uống những liều thuốc khẩn cấp của Tamiflu (oseltamivir) theo loãng

Hướng dẫn:

Sử pha chế liều thuốc uống với lượng tăng dần 30 mg, 45 mg, và 60 mg được cung cấp với thuốc uống thể loãng; liều thuốc 75 mg có thể được tính đúng cách phối hợp của 30 mg và 45 mg. Đề nghị rằng bệnh nhân dùng cách pha chế này. Trong trường hợp phân phan phổi được cung cấp bị mất hay hỏng, liều thuốc chích/tiêm hay phường cách khác được áp dụng để phan phổi những phân lượng sau đây: 2.5 ml (1/2 tsp) cho trẻ em \leq 33 lbs, 3.8 ml (3/4 tsp) cho > 33 đến 51 lbs, 5.0 ml (1tsp) cho > 51 đến 88 lbs, và 6.2 ml ($1 \frac{1}{4}$ tsp) cho > 88 lbs.

Số muống trâc của Tamiflu ở thể loãng để cho một em bé tùy thuộc vào trọng lượng của bé. **Nếu không biết trọng lượng của bé, hãy cân bé trước khi cho uống luống thuốc đầu tiên.** Biểu đồ cho bạn biết bao nhiêu cho bé với một liều thuốc. . Bạn nên cho bé một liều mỗi ngày (một lần vào buổi sáng)

Bao nhiêu Tamiflu Thể loảng Cho một Em bé

Nếu bé cần (lbs) cho bé

IA
ω
ω
S

V 33-51 lbs

V 51 - 388 lbs

V
88 lbs

Một nắp (1/2) muỗng trầu hay 30 mg cua dung dịch Tamiflu

Ba phần tử (3/4) muỗng trà hay 45 mg của dung dịch Tamiflu

Một (1) muỗng trā hay 60 mg của dung dịch Tamiflu

Một và một phần tư ($1\frac{1}{4}$) muỗng trà hay 75 mg của dung dịch Tamiflu

Liều thuốc uống được đề nghị của Tamiflu ngừa cúm ở người lớn và thiếu niên 13 tuổi vẫn lớn hơn là 75 mg mỗi ngày một lần cho 10 ngày. Việc điều trị nên bắt đầu trong vòng 2 ngày phát hiện.

Cách nên giữ dung dịch Tamiflu đã được pha chế sẵn

- Dung dịch Tamiflu được giữ liên tục 10 ngày trong tủ lạnh.